

Haber Bülteni

Sayı: 10713
06/09/2011
10:00

ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ, 2009

Bugüne kadar ölüm istatistikleri ile birlikte üretilen ölüm nedeni istatistikleri, 2009 yılından itibaren ayrı bir istatistik olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Ölüm nedeni istatistikleri, tüm il ve ilçe merkezleri ile hekimi olan tüm yerleşim yerlerinde, hekimler tarafından görülen ölüm vakalarını kapsamaktadır. Bu vakalar için doldurulan “Ölüm Belgesi”, hekimlerin bağlı bulunduğu sağlık kurumu aracılığıyla Türkiye İstatistik Kurumu’na bildirilmektedir.

2009 yılında ilk defa olmak üzere, ölüm vakalarında ölüme sebebiyet veren ve ölümlle ilgili tüm hastalıklar alandan derlenmekte, bu hastalıklar Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 (UHS-10)’a göre kodlanmakta, ölümün altta yatan nedeni de Dünya Sağlık Örgütü kurallarına göre bulunmaktadır.

Bu haber bülteninde altta yatan ölüm nedenleri, UHS-10’a göre seçilen bazı hastalık gruplarına göre cinsiyet ayrımında verilmiştir.

Ölüm nedeni istatistiklerinin il detayında ve yaş grupları bazında yayımlanması, daha sonraki süreçte gerçekleştirilecektir.

Ölüm nedeni bilinen vaka sayısı 280 531’dir.

2009 yılı verilerine göre alandan derlenen ve altta yatan nedeni tespit edilen 280 531 ölümün 155 274’ünü erkek ve 125 257’sini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Ölümlerin % 39,9’u dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanmaktadır.

Ölüme sebep olan ilk beş hastalık grubu sırasıyla; % 39,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları, % 20,7 ile habis urlar, % 8,9 ile solunum sistemi hastalıkları, % 6,4 ile endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve % 4 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler olarak görülmektedir.

Ölüm Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı, 2009

	(%)		
	Toplam	Erkek	Kadın
Toplam	100,0	100,0	100,0
Dolaşım sistemi hastalıkları	39,9	36,2	44,4
Habis urlar	20,7	24,4	16,0
Solunum sistemi hastalıkları	8,9	10,1	7,4
Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar	6,4	4,8	8,3
Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler	4,0	4,9	2,8
Diğer	20,2	19,6	21,0

Habis urların %31,4'ü gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin habis urudur.

Ölüm nedenlerinin yaklaşık % 20'sini oluşturan habis urlarda; ilk beş sırayı % 31,4 ile gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin habis uru, % 8,6 ile midenin habis uru, % 8,6 lenfoid ve hematopoetik habis uru, % 6,3 ile kolonun habis uru, %5 ile pankreasın habis uru almaktadır.

Habis Urların Cinsiyete Göre Dağılımı, 2009

	(%)		
	Toplam	Erkek	Kadın
Habis urlar	20.7	24.4	16.0
Alt grupları	100.0	100.0	100.0
Gırtlak ve soluk borusu / bronş / akciğerin habis uru	31.4	41.2	12.9
Midenin habis uru	8.6	8.5	8.9
Lenfoid ve hematopoetik habis uru	8.6	7.8	10.3
Kolonun habis uru	6.3	5.3	8.1
Pankreasın habis uru	5.0	4.6	5.8
Diğer	40.1	32.6	53.9

Not: Oranlar, habis urlar içindeki yüzdeyi vermektedir.